

LISTA PRELIMINAR DE LOS CURCULIONOIDEA (COLEOPTERA) DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA)¹

M. A. Alonso-Zarazaga, M. Sánchez-Ruiz y T. Domingo-Quero*

RESUMEN

Se presenta por primera vez un listado de los Coleoptera Curculionoidea de la Comunidad de Madrid (España), que incluye 552 especies distribuidas en 175 géneros pertenecientes a 10 familias.

Palabras clave: Coleoptera, Curculionoidea, Madrid, lista preliminar.

ABSTRACT

Preliminary checklist of the Curculionoidea (Coleoptera) of Comunidad de Madrid (Spain)

A checklist of the Coleoptera Curculionoidea of Comunidad de Madrid (Spain) is presented for the first time. It includes 522 species in 175 genera belonging to 10 families.

Key words: Coleoptera, Curculionoidea, Madrid, checklist.

Introducción

Los listados de especies de Curculionoidea presentes en la Península Ibérica tienen su piedra fundacional en dos obras separadas, debido a la costumbre decimonónica de considerar por separado a los gorgojos y a los barrenillos (familias Scolytidae y Platypodidae). Durante todo el siglo XX y principios del XXI diversos autores han aportado pruebas concluyentes para considerar que los Scolytinae son el grupo hermano de la subfamilia Cossoninae de los Curculionidae y que los Platypodidae deben rebajarse a simple tribu dentro

de esta última. Las obras que intentan catalogar por primera vez los Curculionoidea de la Península Ibérica son el listado de Scolytidae ibero-baleares y marroquíes de Manuel Martínez de la Escalera (1919) y la enumeración de Luis Iglesias Iglesias (1922), con muchos errores y omisiones, que completan el inacabado Catálogo de todos los Coleópteros de De la Fuente.

El listado que se presenta a continuación sólo puede considerarse como preliminar. En su elaboración se han tomado como núcleo fundamental las dos obras mencionadas anteriormente, y se ha completado esta relación con las especies mencionadas

* Depto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal, 2; E-27006 Madrid.

¹ Trabajo subvencionado por el Proyecto GR/AMB/0750/2004 de la Comunidad de Madrid.

en 384 obras más, cuya cita detallada sería prolífica en este momento, por lo que deberá esperar a la aparición del Catálogo Ibero-balear completo, que se encuentra aún en fase de preparación. Dado que aún quedan muchas consultas por realizar y muchas obras por despojar, es obligatoria la presunción de preliminariedad.

Ante la falta de sólidas bases filogenéticas en la delimitación de los táxones de Curculionoidea, sigue esta lista la sistemática ecléctica propuesta en su momento por Alonso-Zarazaga y Lyal (1999, 2002). Aquí, sin embargo, se ha recurrido a la ordenación alfabética a ultranza, como hiciera para una lista preliminar ibero-balear Alonso-Zarazaga (2002). Los autores y fechas para los táxones de nivel familia y género pueden hallarse en los trabajos mencionados. Los endemismos ibéricos están marcados con una E y aquellos que sólo se conocen de la CM llevan, en añadidura, un símbolo +. Las especies seguidas de [?] corresponden a citas que no han podido ser comprobadas y que, en la mayoría de los casos, se podrá demostrar que son errores de identificación.

Lista preliminar

<p>ANTHRIBIDAE Anthribinae Trigonorhinini</p> <p><i>Trigonorhinus areolatus</i> (Boheman, 1845)</p> <p>Zygaenodini</p> <p><i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)</p> <p>Urodontinae</p> <p><i>Bruchela carpetana</i> (K. Daniel, 1906) E+</p> <p><i>Bruchela pygmaea</i> (Gyllenhal, 1833)</p> <p><i>Cercomorphus duvalii</i> Perris, 1864</p> <p>APIONIDAE Apioninae Apionini</p> <p><i>Apion distincticolle</i> Desbrochers, 1870 E</p> <p><i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)</p> <p><i>Apion haematodes</i> Kirby, 1808</p> <p><i>Apion rubens</i> Stephens, 1839</p> <p><i>Apion rubiginosum</i> Grill, 1893</p> <p>Aplemonini</p> <p><i>Cistapion cyanescens</i> (Gyllenhal, 1833)</p> <p><i>Perapion (Perapion) ilvense</i> (Wagner, 1905)</p> <p><i>Perapion (Perapion) marchicum</i> (Herbst, 1797)</p>	<p><i>Perapion (Perapion) violaceum violaceum</i> (Kirby, 1808)</p> <p><i>Phrissotrichum (Phrissotrichum) joannium</i> Ehret, 1997</p> <p><i>Phrissotrichum (Phrissotrichum) tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)</p> <p><i>Phrissotrichum (Phrissotrichum) wenckeri</i> (Ch. Brisout, 1863)</p> <p><i>Pseudaplemonus chevrolati</i> (Gyllenhal, 1833)</p> <p><i>Pseudaplemonus limonii limonii</i> (Kirby, 1808)</p> <p>Aspidapiini</p> <p><i>Aspidapion (Aspidapion) radiolus radiolus</i> (Marsham, 1802)</p> <p><i>Aspidapion (Koestlinia) aeneum</i> (Fabricius, 1775)</p> <p>Ceratapiini</p> <p><i>Ceratapion (Acanephodus) onopordi onopordi</i> (Kirby, 1808)</p> <p><i>Ceratapion (Acanephodus) parens</i> (Desbrochers, 1870)</p> <p><i>Ceratapion (Ceratapion) armatum</i> (Gestaeker, 1854) [?]</p> <p><i>Ceratapion (Ceratapion) carduorum</i> (Kirby, 1808)</p> <p><i>Ceratapion (Ceratapion) gibbirostre</i> (Gyllenhal, 1813)</p> <p><i>Ceratapion (Ceratapion) damryi</i> (Desbrochers, 1894)</p> <p><i>Ceratapion (Clementiellus) robusticorne</i> (Desbrochers, 1866)</p> <p><i>Ceratapion (Echinostroma) basicorne</i> (Illiger, 1807)</p> <p><i>Ceratapion (Echinostroma) penetrans wanati</i> Alonso-Zarazaga, 1992</p> <p><i>Ceratapion (Echinostroma) sculptum sculptum</i> (Gerstäcker, 1854)</p> <p><i>Diplapion confluens</i> (Kirby, 1808)</p> <p>Exapiini</p> <p><i>Exapion (Exapion) compactum compactum</i> (Desbrochers, 1888)</p> <p><i>Exapion (Exapion) difficile</i> (Herbst, 1797) [?]</p> <p><i>Exapion (Exapion) elongatissimum</i> (Desbrochers, 1870) E</p> <p><i>Exapion (Exapion) fasciolatum</i> (Wagner, 1912) [?]</p> <p><i>Exapion (Exapion) fuscirostre fuscirostre</i> (Fabricius, 1775)</p> <p><i>Exapion (Exapion) laufferi laufferi</i> (Schilsky, 1906) E</p> <p><i>Exapion (Exapion) putonii</i> (Ch. Brisout, 1866) E</p> <p><i>Lepidapion (Hidryocneme) cretaceum</i> (Rosenhauer, 1856)</p> <p><i>Lepidapion (Lepidapion) acuminatum</i> (Schilsky, 1906)</p> <p><i>Lepidapion (Lepidapion) argentatum</i> (Gerstäcker, 1854)</p> <p><i>Lepidapion (Lepidapion) gallaecianum</i> (Desbrochers, 1894)</p> <p><i>Lepidapion (Lepidapion) squamidorsum</i> (Desbrochers, 1908)</p> <p><i>Lepidapion (Lepidapion) squamigerum</i> (Jacquelin du Val, 1855) [?]</p> <p>Kalcapipiini</p> <p><i>Squamapion atomarium</i> (Kirby, 1808)</p> <p><i>Squamapion flavimanum</i> (Gyllenhal, 1833)</p> <p><i>Squamapion leucophaeatum</i> (Wencker, 1864)</p> <p><i>Squamapion minutissimum</i> (Rosenhauer, 1856)</p> <p><i>Taeniapion rufulum</i> (Wencker, 1864)</p> <p><i>Taeniapion urticarium</i> (Herbst, 1784)</p>
--	---

<p>Malvapiini</p> <p><i>Malvapion malvae</i> (Fabricius, 1775) <i>Pseudapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775) <i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)</p> <p>Oxystomatini</p> <p>Catapiina</p> <p><i>Catapion pubescens</i> (Kirby, 1811) <i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808) <i>Catapion seriatosetosulum</i> (Wencker, 1864)</p> <p>Oxystomatina</p> <p><i>Cyanapion (Bothryorrhynchapion) afer</i> (Gyllenhal, 1833) <i>Cyanapion (Cyanapion) alcyoneum</i> (Germar, 1817) <i>Cyanapion (Cyanapion) columbinum</i> (Germar, 1817) <i>Eutrichapion (Cnemapion) vorax</i> (Herbst, 1797) <i>Eutrichapion (Eutrichapion) mystriophorum</i> Alonso-Zarazaga, 1994 <i>Eutrichapion (Eutrichapion) viciae</i> (Paykull, 1800) [?] <i>Eutrichapion (Psilocalymma) facetum</i> (Gyllenhal, 1839) [?] <i>Hemitrichapion (Dimesomyops) pavidum</i> (Germar, 1817) <i>Holotrichapion (Apiops) pisi</i> (Fabricius, 1801) <i>Holotrichapion (Holotrichapion) ononis ononis</i> (Kirby, 1808) <i>Holotrichapion (Legaricapion) aethiops</i> (Herbst, 1797) <i>Holotrichapion (Legaricapion) gracilicolle</i> (Gyllenhal, 1839) <i>Oxystoma craccae</i> (Linnaeus, 1767) <i>Oxystoma dimidiatum</i> (Desbrochers, 1897) <i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798) <i>Oxystoma subulatum</i> (Kirby, 1808) <i>Pirapion immune</i> (Kirby, 1808)</p> <p>Synapiina</p> <p><i>Ischnopterapion (Chlorapion) virens</i> (Herbst, 1797) <i>Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti</i> (Kirby, 1808) <i>Ischnopterapion (Ischnopterapion) cf. modestum</i> (Germar, 1817) <i>Protopirapion atratum</i> (Germar, 1817) <i>Protopirapion kraatzii</i> (Wencker, 1859) <i>Stenopterapion (Cobosiotherium) cantabricum</i> (Desbrochers, 1870) <i>Stenopterapion (Stenopterapion) tenue</i> (Kirby, 1808)</p> <p>Piezotrachelini</p> <p><i>Protaetia assimile</i> (Kirby, 1808) <i>Protaetia dissimile</i> (Germar, 1817) <i>Protaetia interjectum interjectum</i> (Desbrochers, 1895) <i>Protaetia laevicollis</i> (Kirby, 1811) <i>Protaetia nigritarse</i> (Kirby, 1808) <i>Protaetia schoenherri</i> (Boheman, 1839) <i>Protaetia trifolii</i> (Linnaeus, 1768) <i>Protaetia varipes</i> (Germar, 1817)</p>	<p>ATTELABIDAE</p> <p>Attelabinae</p> <p>Attelabini</p> <p>Attelabina</p> <p><i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763)</p> <p>BRACHYCERIDAE</p> <p>Brachycerinae</p> <p>Brachycerini</p> <p><i>Brachycerus barbarus lateralis</i> Gyllenhal, 1833 <i>Brachycerus callosus</i> Schoenherr, 1833 <i>Brachycerus plicatus</i> Gyllenhal, 1833 <i>Brachycerus pradieri</i> Fairmaire, 1856</p> <p>CURCULIONIDAE</p> <p>Bagoinae</p> <p>Bagoini</p> <p><i>Bagous argillaceus</i> Gyllenhal, 1836 <i>Bagous exilis</i> Jacquelin du Val, 1854 <i>Bagous lutosus</i> (Gyllenhal, 1813)</p> <p>Baridinae</p> <p>Baridini</p> <p>Baridina</p> <p><i>Arganthonius albomaculatus</i> (H. Brisout, 1867) E <i>Aulacobaris caeruleascens</i> (Scopoli, 1763) <i>Aulacobaris cuprirostris</i> (Fabricius, 1787) <i>Aulacobaris fallax</i> (H. Brisout, 1870) <i>Aulacobaris cf. guedenusi</i> (Schultze, 1901) <i>Aulacobaris ignifer</i> (Fuente, 1901) E <i>Aulacobaris prasina prasina</i> (Boheman, 1836) <i>Eremobaris picturata opiparis</i> (Jacquelin du Val, 1852) <i>Labiaticola teruelensis</i> (Hustache, 1928) E <i>Malvaevora timida</i> (Rossi, 1792) <i>Melaleucus sellatus</i> (Boheman, 1844) <i>Melanobaris laticollis</i> (Marsham, 1802) <i>Melanobaris morio</i> (Boheman, 1844) <i>Melanobaris quadraticollis</i> (Boheman, 1836) <i>Melanobaris sinapis</i> (Normand, 1937)</p> <p>Ceutorhynchinae</p> <p>Ceutorhynchini</p> <p><i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> Germar, 1824 <i>Ceutorhynchus alternans</i> Ch. Brisout, 1869 E+ <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1800) <i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> Germar, 1824 <i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787) <i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> Solari, 1949 <i>Ceutorhynchus gracilis</i> Dieckmann & Smreczyński, 1972 <i>Ceutorhynchus hirtulus</i> Germar, 1824 <i>Ceutorhynchus insidiosus</i> Ch. Brisout, 1869 E+ <i>Ceutorhynchus leucorhamma</i> Rosenhauer, 1856 <i>Ceutorhynchus minutus</i> (Reich, 1797) <i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837</p>
--	---

<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)	
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)	
<i>Ceutorhynchus parvulus</i> Ch. Brisout, 1869	
<i>Ceutorhynchus perrisi</i> Ch. Brisout, 1869	
<i>Ceutorhynchus picitarsis</i> Gyllenhal, 1837	
<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> (Marsham, 1802)	
<i>Ceutorhynchus rhenanus</i> (Schultze, 1895)	
<i>Ceutorhynchus sardeanensis</i> Schultze, 1903	
<i>Ceutorhynchus sophiae</i> Gyllenhal, 1837	
<i>Ceutorhynchus</i> sp.	
<i>Ceutorhynchus squamulosus</i> Ch. Brisout, 1869	
<i>Ceutorhynchus striatellus</i> Schultze, 1900	
<i>Ceutorhynchus subpilosus</i> Ch. Brisout, 1869	
<i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (Paykull, 1800)	
<i>Ceutorhynchus tibialis</i> Boheman, 1845	
<i>Ceutorhynchus unguicularis</i> Thomson, 1871	
<i>Coeliastes lamii</i> (Fabricius, 1793)	
<i>Coeloides ilicis</i> (Bedel, 1885)	
<i>Coeloides rana</i> (Fabricius, 1787)	
<i>Coeloides ruber</i> (Marsham, 1802)	
<i>Coeloides transversealbofasciatus</i> (Goeze, 1777)	
<i>Glocianus distinctus</i> (Ch. Brisout, 1870)	
<i>Glocianus lethierryi</i> (Ch. Brisout, 1866)	
<i>Glocianus nebulosus</i> (Ch. Brisout, 1866)	
<i>Hadropontus trimaculatus</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Microplontus rugulosus</i> (Herbst, 1795)	
<i>Mogulones abbreviatulus</i> (Fabricius, 1793)	
<i>Mogulones arcasi</i> (Ch. Brisout, 1869)	
<i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777)	
<i>Mogulones larvatus</i> (Schultze, 1897)	
<i>Mogulones t-album</i> (Gyllenhal, 1837)	
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Neoglocianus maculaalba</i> (Herbst, 1795)	
<i>Oprohinus suturalis</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Parethelcus pollinarius</i> (Forster, 1771)	
<i>Prisistus biscutellatus</i> (Chevrolat, 1859)	
<i>Ranunculiphilus</i> (<i>Ranunculiphilus</i>) <i>obscurus</i> (Ch. Brisout, 1869)	
<i>Stenocarus ruficornis</i> (Stephens, 1831)	
<i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyllenhal, 1837)	
<i>Thamiocolus subulatus</i> (Ch. Brisout, 1869)	
<i>Trichosirocalus barnevillei</i> (Grenier, 1866)	
<i>Trichosirocalus briesei</i> Alonso-Zarazaga & Sánchez-Ruiz, 2002	
<i>Trichosirocalus histrix</i> (Perris, 1852)	
<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787)	
<i>Zacladus exiguus</i> (Olivier, 1807)	
HYPURINI	
<i>Aphytobius fuentei</i> (Desbrochers, 1908)	
<i>Aphytobius sphaerion</i> (Bohemian, 1845) [?]	
<i>Hypurus bertrandi</i> (Perris, 1852)	
Mononychini	
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	
Phytobiini	
<i>Neophytobius granatus</i> (Gyllenhal, 1836)	
<i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (Fabricius, 1787)	
Cionini	
<i>Rhinoncus castor</i> (Fabricius, 1793)	
<i>Rhinoncus pericarpinus</i> (Linnaeus, 1758)	
Conoderinae	
Coryssomerini	
<i>Coryssomerus capucinus</i> (Beck, 1817)	
Cossoninae	
Cossonini	
E+	<i>Cossonus</i> (<i>Cossonus</i>) <i>linearis</i> (Fabricius, 1775)
	<i>Mesites</i> (<i>Mesites</i>) <i>aquitanus</i> Fairmaire, 1859
Onycholipini	
Brachytemnus <i>porcatus</i> (Germar, 1824)	
Hexarthrum <i>exiguum</i> (Bohemian, 1838)	
<i>Stenoscelis</i> (<i>Stenoscelis</i>) <i>submuricatus</i> (Bohemian, 1837)	
Rhyncolini	
Phloeophagina	
<i>Melicius cylindrus</i> (Bohemian, 1838)	
<i>Melicius gracilis</i> (Rosenhauer, 1856)	
Rhyncolina	
<i>Rhyncolus</i> (<i>Axenomimetes</i>) <i>reflexus</i> Boheman, 1838	
<i>Rhyncolus</i> (<i>Rhyncolus</i>) <i>ater</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Rhyncolus</i> (<i>Rhyncolus</i>) <i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)	
Cryptorhynchinae	
Cryptorhynchini	
Cryptorhynchina	
<i>Cryptorhynchus</i> (<i>Cryptorhynchus</i>) <i>lapathi</i> (Linnaeus, 1758)	
Tylodina	
<i>Echinodera</i> sp.	
Curculioninae	
Acentrusini	
<i>Acentrus histrio</i> (Schoenherr, 1837)	
Anthonomini	
<i>Anthonomus</i> (<i>Anthomorphus</i>) <i>phyllocola</i> (Herbst, 1795)	
<i>Anthonomus</i> (<i>Anthonomus</i>) <i>rubi</i> (Herbst, 1795)	
<i>Anthonomus</i> (<i>Anthonomus</i>) <i>ulmi</i> (DeGeer, 1775)	
<i>Anthonomus</i> (<i>Furcipes</i>) <i>rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Brachonyx pineti</i> (Paykull, 1793)	
<i>Bradybatus</i> (<i>Nothops</i>) <i>elongatus</i> (Bohemian, 1843)	

<i>Cionus olivieri</i> Rosenschoeld, 1838	<i>Pachytychius maculosus</i> Reitter, 1907	E
<i>Cionus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pachytychius sparsutus</i> (Olivier, 1807)	
<i>Cionus thapsus</i> (Fabricius, 1793)		
<i>Stereonychus fraxini</i> (DeGeer, 1775)		
Curculionini	Styphlini	
Curculionina		
<i>Archarius ochreatus</i> (Fåhraeus, 1843)	<i>Orthochaetes extensus</i> (Chevrolat, 1880)	
<i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)	<i>Orthochaetes rectirostris</i> Hoffmann, 1960	E
<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1836)	<i>Orthochaetes setiger</i> (Beck, 1817)	
<i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802		
<i>Curculio pellitus</i> (Boheman, 1843)		
<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)		
<i>Curculio villosus</i> Fabricius, 1781		
Ellescini	Tychiini	
Dorytomina	Lignyodina	
<i>Dorytomus (Dorytomus) dejeani</i> Faust, 1883	<i>Lignyodes enucleator</i> (Panzer, 1798)	
<i>Dorytomus (Dorytomus) edoughensis</i> Desbrochers, 1875		
<i>Dorytomus (Dorytomus) longimanus</i> (Forster, 1771)		
<i>Dorytomus (Olamus) melanophthalmus</i> (Paykull, 1793)		
Mecinini	Tychiina	
<i>Cleopomiarus distinctus</i> (Boheman, 1845)	<i>Sibinia (Dichotychius) sodalis</i> Germar, 1824	
<i>Cleopomiarus meridionalis</i> (H. Brisout, 1862)	<i>Sibinia (Sibinia) arenariae</i> Stephens, 1831	
<i>Cleopomiarus plantarum</i> (Germar, 1824)	<i>Sibinia (Sibinia) attalica</i> Gyllenhal, 1835	
<i>Gymnetron beccabungae</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Sibinia (Sibinia) femoralis</i> Germar, 1824	
<i>Gymnetron rostellum</i> (Herbst, 1795)	<i>Sibinia (Sibinia) iberica</i> Hoffmann, 1960	E
<i>Gymnetron villosum</i> Gyllenhal, 1838	<i>Sibinia (Sibinia) pellucens</i> (Scopoli, 1772)	
<i>Mecinus circulatus</i> (Marsham, 1802)	<i>Sibinia (Sibinia) primita</i> (Herbst, 1795)	
<i>Mecinus</i> sp.	<i>Sibinia (Sibinia) pyrrhocadyla</i> (Marsham, 1802)	
<i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)	<i>Sibinia (Sibinia) subelliptica</i> Desbrochers, 1873	
<i>Rhinusa antirrhini</i> (Paykull, 1800)	<i>Sibinia (Sibinia) variata</i> Gyllenhal, 1835	
<i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1793)	<i>Tychius (Tychius) argentatus</i> Chevrolat, 1859	
<i>Rhinusa vestita</i> (Germar, 1821)	<i>Tychius (Tychius) aurichalceus</i> Gyllenhal, 1836	E
Rhamphini	<i>Tychius (Tychius) cinnamomeus</i> Kiesenwetter, 1852	
Rhamphina	<i>Tychius (Tychius) consputus</i> Kiesenwetter, 1851	
<i>Isochnus foliorum</i> (Müller, 1776)	<i>Tychius (Tychius) cuprifer</i> (Panzer, 1799)	
<i>Orchestes (Orchestes) avellanae</i> (Donovan, 1797)	<i>Tychius (Tychius) cuprinus</i> Rosenhauer, 1856	E
<i>Orchestes (Orchestes) erythropus tricolor</i> Kiesenwetter, 1851	<i>Tychius (Tychius) cylindricollis</i> Solari, 1950	E
<i>Orchestes (Orchestes) irroratus</i> Kiesenwetter, 1852	<i>Tychius (Tychius) elegans</i> Desbrochers, 1896	
<i>Orchestes (Orchestes) pilosus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Tychius (Tychius) elegantulus</i> Ch. Brisout, 1862	
<i>Orchestes (Orchestes) quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tychius (Tychius) farinosus</i> Rosenhauer, 1856	
<i>Rhamphus (Rhamphus) pulicarius</i> (Herbst, 1795)	<i>Tychius (Tychius) funicularis</i> Ch. Brisout, 1862	
<i>Rhamphus (Rhamphus) subaeneus</i> (Illiger, 1807)	<i>Tychius (Tychius) fuscipes</i> Chevrolat, 1859	
Smicronychini	<i>Tychius (Tychius) grenieri</i> Ch. Brisout, 1861	
<i>Smicronyx (Smicronyx) jungermanniae</i> (Reich, 1797)	<i>Tychius (Tychius) hispanus</i> Velázquez de Castro & Caldara, 1992	E
<i>Smicronyx (Smicronyx) reichi</i> (Gyllenhal, 1836)		
Storeini		
<i>Pachytychius asperatus</i> (Dufour, 1843)	<i>Tychius (Tychius) laticollis</i> Perris, 1864	
<i>Pachytychius haematocephalus</i> (Gyllenhal, 1835)	<i>Tychius (Tychius) longicollis</i> Ch. Brisout, 1862	
<i>Pachytychius hordei squamosus</i> (Gyllenhal, 1836)	<i>Tychius (Tychius) parallelus</i> (Panzer, 1794)	
Cyclominae	<i>Tychius (Tychius) picirostris</i> (Fabricius, 1787)	
	<i>Tychius (Tychius) polylineatus</i> (Germar, 1824)	
	<i>Tychius (Tychius) pusillus</i> Germar, 1824	
	<i>Tychius (Tychius) quinquepunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Tychius (Tychius) rufipennis</i> Ch. Brisout, 1862	
	<i>Tychius (Tychius) squamulatus</i> Gyllenhal, 1836	
	<i>Tychius (Tychius) tibialis</i> Boheman, 1843	
Dichotrichelini		
<i>Dichotrichelus dellabeffai</i> Meregalli, 1982 [?]		
<i>Dichotrichelus graellsii</i> graellsii Perris, 1864		E
Rhytidrinini		
Gronopina		
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) bonvouloirii</i> (Ch. Brisout, 1866)		

<i>Entomoderus (Pseudorhinus) caudatus</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	<i>Otiorhynchus (Jelenantus) affaber</i> Boheman, 1843
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) interruptus</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	<i>Otiorhynchus (Metoporrhynchus) veterator</i> Uyttenboogaart, 1932
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) laesirostris stenoderus</i> (Gemminger, 1871)		<i>Otiorhynchus (Otiorhynchus) truncatellus</i> Graells, 1858
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) longulus longulus</i> (Rosenhauer, 1856)		E
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) oberthueri</i> (Desbrochers, 1910)	E+	<i>Otiorhynchus (Petalorrhynchus) validus</i> Stierlin, 1881
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) tenuipes</i> (Solari, 1940) [?]		E
<i>Entomoderus (Pseudorhinus) variabilis</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	<i>Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)
<i>Gronops luctuosus</i> Chevrolat, 1861		Peritelini
<i>Gronops lunatus lunatus</i> (Fabricius, 1775)		<i>Pseudomeira prolixa</i> (Kiesenwetter, 1851)
Entiminae		Phyllobiini
Alophini		
<i>Rhytidères plicatus</i> (Olivier, 1790)		
Brachyderini		
<i>Brachyderes (Brachyderes) grisescens</i> Fairmaire, 1862		
<i>Brachyderes (Brachyderes) incanus</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Brachyderes (Brachyderes) lineolatus</i> Fairmaire, 1862		
<i>Brachyderes (Brachyderes) pubescens</i> Boheman, 1833		
<i>Brachyderes (Brachyderes) suturalis</i> Graells, 1851	E	
<i>Brachyderes (Brachylophus) lusitanicus</i> (Fabricius, 1781)		
<i>Brachyderes (Gastraspis) marginellus</i> Graells, 1858	E	
<i>Strophomorphus porcellus</i> (Schoenherr, 1832)		
<i>Strophosoma (Neliocarus) ebenista</i> (Seidlitz, 1870)	E	
<i>Strophosoma (Neliocarus) faber</i> (Herbst, 1784)		
<i>Strophosoma (Neliocarus) laufferi</i> (Flach, 1907)	E	
<i>Strophosoma (Strophosoma) erinaceus</i> (Chevrolat, 1865)		
<i>Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum melanogrammum</i> (Forster, 1771)		
Cneorhinini		
<i>Attactagenus carinirostris</i> (Boheman, 1840)		
<i>Attactagenus ceballosi</i> Viedma, 1965	E	
<i>Attactagenus cordubensis</i> (Kirsch, 1870)	E	
<i>Attactagenus diecki</i> (Tournier, 1874)	E	
<i>Attactagenus dispar</i> (Graells, 1858)	E	
<i>Attactagenus moralesi</i> Viedma, 1965	E	
<i>Attactagenus pyriformis</i> (Boheman, 1833)	E	
<i>Attactagenus spinipes</i> (Pérez Arcas, 1872)	E	
<i>Attactagenus tarsalis</i> (Tournier, 1874)	E	
<i>Cneorhinus argentifer</i> Marseul, 1866		
<i>Philopedon plagiatum</i> (Schaller, 1783)	E+	
<i>Polydius hispanus hispanus</i> (Herbst, 1797)	E	
Otiorhynchini		
<i>Otiorhynchus (Arammichnus) cribicollis</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus</i> (Fabricius, 1775)		
<i>Otiorhynchus (Harpinorrhynchus) dentipes dentipes</i> Graells, 1858	E	
Otiorhynchini		
<i>Otiorhynchus (Jelenantus) affaber</i> Boheman, 1843		
<i>Otiorhynchus (Metoporrhynchus) veterator</i> Uyttenboogaart, 1932		
<i>Otiorhynchus (Otiorhynchus) truncatellus</i> Graells, 1858	E	
<i>Otiorhynchus (Petalorrhynchus) validus</i> Stierlin, 1881	E	
<i>Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)		
Peritelini		
<i>Pseudomeira prolixa</i> (Kiesenwetter, 1851)		
Phyllobiini		
<i>Phyllobius (Phyllobius) pyri</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Phyllobius (Phyllobius) squamosus</i> Ch. Brisout, 1866	E	
<i>Phyllobius (Phyllobius) tuberculifer</i> Chevrolat, 1865	E	
<i>Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris virideaeris</i> (Laicharting, 1781)		
Polydrusini		
<i>Homapterus punctulatus</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	
<i>Pachyrhinus glabratus</i> (Chevrolat, 1866)	E	
<i>Pachyrhinus squamosus</i> (Kiesenwetter, 1852)		
<i>Polydrusus (Chaerodrys) setifrons</i> Jacquelin du Val, 1852		
<i>Polydrusus (Chomatocryptus) xanthopus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Polydrusus (Eurodrusus) chrysomela</i> (Olivier, 1807)	E	
<i>Polydrusus (Eurodrusus) confluens</i> Stephens, 1831		
<i>Polydrusus (Eustolus) corruscus</i> Germar, 1824		
<i>Polydrusus (Eustolus) impressifrons</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Polydrusus (Eustolus) interstitialis</i> Perris, 1864	E	
<i>Polydrusus (Eustolus) pterygomalis</i> Boheman, 1840		
<i>Polydrusus (Leucodrusus) senex</i> Chevrolat, 1866	E	
<i>Polydrusus (Leucodrusus) tibialis</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Polydrusus (Neoeustolus) pilosulus</i> Chevrolat, 1865	E	
Sciaphilini		
<i>Barypeithes (Barypeithes) sulcifrons</i> (Boheman, 1843)		
<i>Pleurodirus (Pleurodirus) carinula</i> (Olivier, 1807)		
Sitonini		
<i>Sitona (Charagmus) cachectus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Sitona (Charagmus) gressorius</i> (Fabricius, 1793)		
<i>Sitona (Charagmus) griseus</i> (Fabricius, 1775)		
<i>Sitona (Charagmus) intermedius</i> (Kuester, 1847)		
<i>Sitona (Sitona) cambricus</i> Stephens, 1831		
<i>Sitona (Sitona) cinerascens</i> Fähraeus, 1840		
<i>Sitona (Sitona) cinnamomeus</i> Allard, 1863		
<i>Sitona (Sitona) discoideus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Sitona (Sitona) gemellatus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Sitona (Sitona) hispidulus</i> (Fabricius, 1777)		
<i>Sitona (Sitona) humeralis</i> Stephens, 1831		
<i>Sitona (Sitona) lepidus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Sitona (Sitona) lineatus</i> (Linnaeus, 1758)		
<i>Sitona (Sitona) longulus</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Sitona (Sitona) macularius</i> (Marsham, 1802)		

<i>Sitona (Sitona) puberulus</i> Reitter, 1903		<i>Hypera (Dapalinus) striata</i> (Boheman, 1834)
<i>Sitona (Sitona) puncticollis</i> Stephens, 1831		<i>Hypera (Hypera) constans</i> (Boheman, 1834)
<i>Sitona (Sitona) regensteinensis</i> (Herbst, 1797)		<i>Hypera (Hypera) fuscocinerea</i> (Marsham, 1802)
<i>Sitona (Sitona) sulcifrons argutulus</i> Gyllenhal, 1834		<i>Hypera (Hypera) lethierryi</i> (Capiomont, 1868)
<i>Sitona (Sitona) tenuis</i> Rosenhauer, 1847		<i>Hypera (Hypera) nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)
	Tanymecini	<i>Hypera (Hypera) plantaginis</i> (DeGeer, 1775)
	Tanymecina	<i>Hypera (Hypera) postica</i> (Gyllenhal, 1813)
<i>Cycloderes (Cycloderes) argenteus</i> (Perris, 1866)		<i>Hypera (Hypera) venusta</i> (Fabricius, 1781)
<i>Cycloderes (Cycloderes) glabratus</i> (Gyllenhal, 1833)	E	<i>Hypera (Kippenbergia) arator</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cycloderes (Cycloderes) heliophilus</i> (Chevrolat, 1866)	E	<i>Hypera (Tigrinellus) pastinaceae</i> (Rossi, 1790)
<i>Cycloderes (Cycloderes) latithorax</i> (Desbrochers, 1872)	E	<i>Limobius borealis borealis</i> (Paykull, 1792)
<i>Cycloderes (Cycloderes) tessellatus</i> (Gyllenhal, 1833)	E	<i>Limobius mixtus</i> Boheman, 1834
<i>Cycloderes (Cycloderes) tonsus</i> (Chevrolat, 1866)	E	
	Trachyphloeini	<i>Lixinae</i>
	Trachyphloeina	<i>Cleonini</i>
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) carpetanus</i> Uhagón, 1885	E	<i>Bothynoderes affinis</i> (Schrank, 1781)
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) chevrolati</i> Seidlitz, 1868	E	<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) horrens</i> horrens (Gyllenhal, 1834)		<i>Coniocleonus cicatricosus</i> (Hoppe, 1795)
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) myrmecophilus</i> (Seidlitz, 1868)		<i>Coniocleonus excoriatus</i> (Gyllenhal, 1834)
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) porculus</i> Uhagón, 1885	E	<i>Coniocleonus graellsii</i> Chevrolat, 1873
<i>Cathormiocerus (Cathormiocerus) socius</i> Boheman, 1843		<i>Coniocleonus nigrosuturatus</i> (Goeze, 1777)
<i>Cathormiocerus (Mitomermus) brevirostris</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	<i>Coniocleonus sejunctus</i> (Faust, 1904)
<i>Cathormiocerus (Schaumius) excisor</i> Stierlin, 1868		<i>Cyphocleonus hedenborgi</i> (Fåhraeus, 1842)
<i>Cathormiocerus (Schaumius) irrasus</i> irrasus Seidlitz, 1868	E	<i>Ephimeronotus miegii</i> (Fairmaire, 1855)
<i>Cathormiocerus (Schaumius) lapidicola</i> Chevrolat, 1866	E	<i>Leucomigus tessellatus</i> (Fairmaire, 1849)
<i>Cathormiocerus (Schaumius) lethierryi</i> Chevrolat, 1866		<i>Mecaspis alternans</i> (Herbst, 1795)
<i>Cathormiocerus (Schaumius) pygmaeus</i> Seidlitz, 1868		<i>Pseudocleonus (Pseudocleonus) carinatus</i> (Gyllenhal, 1834)
<i>Cathormiocerus</i> sp.		<i>Xanthochelus cinctiventris marmottani</i> (Ch. Brisout, 1866)
<i>Trachyphloeus (Lacordairius) seidlitzii</i> (Ch. Brisout, 1866)	E	
<i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) angustisetulus</i> Hansen, 1915		<i>Lixini</i>
<i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) guadarramus</i> Seidlitz, 1868	E	
	Hyperinae	<i>Larinus (Cryphopus) cf. bombycinus</i> Lucas, 1846
	Hyperini	<i>Larinus (Larinomesius) meridionalis</i> Rosenhauer, 1856
<i>Coniatus (Bagoides) suavis</i> Gyllenhal, 1834		
<i>Coniatus (Coniatus) repandus</i> (Fabricius, 1793)		
<i>Donus (Antidonus) brevirostris</i> (Capiomont, 1868)	E+	
<i>Donus (Antidonus) dauci</i> (Olivier, 1807)		
<i>Donus (Antidonus) lunatus</i> (Wollaston, 1854)		
<i>Donus (Antidonus) zoilus</i> (Scopoli, 1763)		
<i>Donus (Donus) hispanicus</i> (Capiomont, 1868)	E	
<i>Donus (Donus) cf. hispanicus</i> (Capiomont, 1868)		
<i>Donus (Donus) perrisi</i> (Capiomont, 1868)	E	
<i>Donus (Donus) cf. perrisi</i> (Capiomont, 1868)		
	Hyperinae	<i>Larinus (Larinomesius) cf. meridionalis</i> Rosenhauer, 1856
	Hyperini	<i>Larinus (Larinomesius) obtusus australis</i> Capiomont, 1874
<i>Coniatus (Bagoides) suavis</i> Gyllenhal, 1834		<i>Larinus (Larinomesius) scolymi</i> (Olivier, 1807)
<i>Coniatus (Coniatus) repandus</i> (Fabricius, 1793)		<i>Larinus (Larinus) cynarae</i> (Fabricius, 1787)
<i>Donus (Antidonus) brevirostris</i> (Capiomont, 1868)	E+	<i>Larinus (Larinus) flavescens</i> Germar, 1824
<i>Donus (Antidonus) dauci</i> (Olivier, 1807)		<i>Larinus (Larinus) ursus</i> (Fabricius, 1793) s.l.
<i>Donus (Antidonus) lunatus</i> (Wollaston, 1854)		<i>Larinus (Phyllonomeus) albocinctus</i> Chevrolat, 1866
<i>Donus (Antidonus) zoilus</i> (Scopoli, 1763)		<i>Larinus (Phyllonomeus) escorialensis</i> Ch. Brisout, 1866
<i>Donus (Donus) hispanicus</i> (Capiomont, 1868)	E	<i>Larinus (Phyllonomeus) jaceae</i> (Fabricius, 1775) [?]
<i>Donus (Donus) cf. hispanicus</i> (Capiomont, 1868)		<i>Larinus (Phyllonomeus) lethierryi</i> Ch. Brisout, 1866 E
<i>Donus (Donus) perrisi</i> (Capiomont, 1868)	E	<i>Larinus (Phyllonomeus) longirostris</i> Gyllenhal, 1835
<i>Donus (Donus) cf. perrisi</i> (Capiomont, 1868)		<i>Larinus (Phyllonomeus) planus</i> (Fabricius, 1793)
	Hyperinae	<i>Larinus (Phyllonomeus) sturnus</i> (Schaller, 1783)
	Hyperini	<i>Larinus (Phyllonomeus) turbinatus</i> Gyllenhal, 1835
<i>Coniatus (Bagoides) suavis</i> Gyllenhal, 1834		<i>Lixus (Compsolixus) albomarginatus</i> Boheman, 1843
<i>Coniatus (Coniatus) repandus</i> (Fabricius, 1793)		<i>Lixus (Compsolixus) anguinus</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Donus (Antidonus) brevirostris</i> (Capiomont, 1868)	E+	<i>Lixus (Compsolixus) ascanii</i> (Linnaeus, 1767) [?]
<i>Donus (Antidonus) dauci</i> (Olivier, 1807)		<i>Lixus (Compsolixus) castellanus</i> Chevrolat, 1865 E
<i>Donus (Antidonus) lunatus</i> (Wollaston, 1854)		<i>Lixus (Compsolixus) juncii</i> Boheman, 1835
<i>Donus (Antidonus) zoilus</i> (Scopoli, 1763)		<i>Lixus (Compsolixus) laufferi</i> Petri, 1905 E+
<i>Donus (Donus) hispanicus</i> (Capiomont, 1868)		
<i>Donus (Donus) cf. hispanicus</i> (Capiomont, 1868)		
<i>Donus (Donus) perrisi</i> (Capiomont, 1868)		
<i>Donus (Donus) cf. perrisi</i> (Capiomont, 1868)		

- Lixus (Dilixellus) pulverulentus* (Scopoli, 1763)
Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman, 1835
Lixus (Dilixellus) rumicis Hoffmann, 1956
Lixus (Dilixellus) vilis (Rossi, 1790)
Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1807
Lixus (Epimeces) filiformis (Fabricius, 1781)
Lixus (Epimeces) flaveolus Motschulsky, 1849
Lixus (Epimeces) scolopax Boheman, 1835
Lixus (Epimeces) ulcerosus Petri, 1904
Lixus (Eulixus) brevipes Ch. Brisout, 1866
Lixus (Eulixus) brevirostris Boheman, 1836
Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807
Lixus (Eulixus) scabricollis Boheman, 1843
Lixus (Lixoglyptus) spartii Olivier, 1807
Lixus (Ortholixus) acicularis Germar, 1824
Lixus (Ortholixus) elegantulus Boheman, 1843
Lixus (Ortholixus) mucronatus (Olivier, 1790)
Lixus (Ortholixus) puncticollis Ch. Brisout, 1866
Microlarinus lareynii (Jacquelin du Val, 1852)
- Rhinocyllini
- Rhinocyllus conicus* (Froelich, 1792)
- Mesoptiliinae
- Magdalidini
- Magdalis (Laemosaccidius) exarata* Ch. Brisout, 1862
Magdalis (Magdalis) duplicita Germar, 1824
Magdalis (Magdalis) frontalis (Gyllenhal, 1827)
Magdalis (Magdalis) memnonia (Gyllenhal, 1827)
Magdalis (Magdalis) phlegmatica (Herbst, 1797)
Magdalis (Magdalis) rufa (Germar, 1824)
Magdalis (Magdalis) violacea (Linnaeus, 1758)
Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Geoffroy, 1785)
Magdalis (Panus) barbicornis (Latreille, 1804)
- Molytinae
- Hylobiini
- Hylobiina
- Hylobius (Callirus) abietis* (Linnaeus, 1758)
- Molytini
- Molytina
- Anisorhynchus hespericus* Desbrochers, 1875
- Plinthina
- Iberoplinthus perezii* (Ch. Brisout, 1866)
- Pissodini
- Pissodina
- Pissodes (Pissodes) castaneus* (DeGeer, 1775)
Pissodes (Pissodes) pini (Linnaeus, 1758)
Pissodes (Pissodes) piniphilus (Herbst, 1797)
Pissodes (Pissodes) validirostris (C.R. Sahlberg, 1834)
- Scolytinae
- Corthylini
- E** *Pityophthorus glabratus* Eichhoff, 1871
- Crypturgini
- E** *Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793)
Crypturgus cribrellus (Reitter, 1894)
Crypturgus mediterraneus Eichhoff, 1869
Crypturgus numidicus Ferrari, 1867
- Hylastini
- Hylastes angustatus* (Herbst, 1793)
Hylastes ater (Paykull, 1800)
Hylastes attenuatus Erichson, 1836
Hylastes linearis Erichson, 1836
Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828)
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
- Hylesinini
- Hylesinus crenatus* (Fabricius, 1787)
Hylesinus varius (Fabricius, 1775)
Pteleobius kraatzi (Eichhoff, 1864)
Pteleobius vittatus (Fabricius, 1793)
- Hypoborini
- Hypoborus fucus* Erichson, 1836
- Ipini
- Ips (Cumatotomicus) sexdentatus* (Boerner, 1767)
Ips (Cyrtotomicus) acuminatus (Gyllenhal, 1827)
Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)
Orthotomicus laricis (Fabricius, 1793)
Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827)
Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1868)
Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784)
Pityogenes calcaratus (Eichhoff, 1878)
Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)
- Phloeotribini
- Phloeotribus rhododactylus* (Marsham, 1802)
Phloeotribus scarabaeoides (Bernard, 1788)
- Scolytini
- E** *Scolytus carpini* (Ratzeburg, 1837)
Scolytus kirschii fasciatus Reitter, 1890
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)
Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)
Scolytus rugulosus (Müller, 1818)
Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
- Tomicini
- Hylurgus ligniperda* (Fabricius, 1787)
Hylurgus micklitzii Wachtl, 1881
Tomicus minor (Hartig, 1834)
Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)

<p>Xyleborini</p> <p><i>Xyleborinus attenuatus</i> (Blandford, 1894)</p> <p><i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)</p> <p><i>Xyleborus eurygraphus</i> (Ratzeburg, 1837)</p> <p>Xyloterini</p> <p><i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795)</p> <p><i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1793)</p> <p>DRYOPHTHORIDAE</p> <p>Rhynchophorinae</p> <p>Litosomini</p> <p><i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855</p> <p>Sphenophorini</p> <p><i>Sphenophorus parumpunctatus</i> Gyllenhal, 1838</p> <p><i>Sphenophorus piceus</i> (Pallas, 1776)</p> <p><i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)</p> <p>ERIRHINIDAE</p> <p>Erirhininae</p> <p>Erirhinini</p> <p><i>Notaris scirpi</i> (Fabricius, 1793)</p> <p>NANOPHYIDAE</p> <p>Nanophyinae</p> <p>Corimaliini</p> <p><i>Corimalia postica</i> (Gyllenhal, 1838)</p> <p><i>Corimalia tamarisci</i> (Gyllenhal, 1838)</p> <p><i>Corimalia tetrasigma</i> (Aubé, 1863)</p> <p><i>Hypophyes minutissimus</i> (Tournier, 1867)</p> <p><i>Hypophyes pallidulus</i> (Gravenhorst, 1807)</p> <p>Nanophyini</p> <p><i>Ctenomeropsis nigra</i> (Waltl, 1835)</p> <p><i>Dieckmanniellus gracilis</i> (Redtenbacher, 1849)</p> <p><i>Dieckmanniellus nitidulus</i> (Gyllenhal, 1838)</p> <p><i>Nanomimus hemisphaericus</i> (Olivier, 1807)</p> <p><i>Nanophyes brevis bleusei</i> Pic, 1900</p> <p><i>Nanophyes rubricus</i> Rosenhauer, 1856</p> <p><i>Pericartiellus flavidus</i> (Aubé, 1850)</p> <p>NEMONYCHIDAE</p> <p>Cimberidinae</p> <p>Doydirhynchini</p> <p><i>Doydirhynchus austriacus</i> (Olivier, 1807)</p> <p>RHYNCHITIDAE</p> <p>Rhynchitinae</p> <p>Auletini</p> <p>Auletina</p> <p><i>Auletes tubicen</i> Schoenherr, 1826</p> <p><i>Auletobius (Mesaultobius) pubescens</i> (Kiesenwetter, 1852)</p>	<p>Rhynchitini</p> <p>Rhynchitina</p> <p><i>Haplorthynchites (Haplorthynchites) pubescens</i> (Fabricius, 1775)</p> <p><i>Lasiorhynchites (Coccygorrhynchites) sericeus</i> (Herbst, 1797)</p> <p><i>Lasiorhynchites (Stenorhynchites) caeruleocephalus</i> (Schaller, 1783)</p> <p><i>Neocoenorrhinus interpunctatus</i> (Stephens, 1831)</p> <p><i>Rhynchites (Epirhynchites) auratus</i> (Scopoli, 1763)</p> <p><i>Rhynchites (Rhynchites) bacchus</i> (Linnaeus, 1758)</p> <p><i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767)</p> <p><i>Temnocerus tomentosus</i> (Gyllenhal, 1839)</p>		
Conclusión			

Los táxones de Curculionoidea de la CM siguen el patrón usual de la diversidad de este grupo en la Península; sin embargo, con los datos de que disponemos en este momento podemos asegurar que el número de táxones nuevos para la CM deberá aumentar con las prospecciones adecuadas. Se ofrece como colofón una tabla con los datos numéricos por familias:

Familia	Nº de géneros	Nº de especies	Especies dudosas
Anthribidae	4	5	
Apionidae	26	84	5
Attelabidae	1	1	
Brachyceridae	1	4	
Curculionidae	124	430	4
Dryophthoridae	2	4	
Erirhinidae	1	1	
Nanophyidae	7	12	
Nemonychidae	1	1	
Rhynchitidae	8	10	
Total:	175	552	9

Al comparar estos datos con los presentados por Alonso-Zarazaga (2002) para todo el área ibero-balear, queda patente que la CM es una de las zonas mejor conocidas, habiéndose encontrado en ella el 71,4% de las familias, el 46,9% de los géneros y el 32% de las especies halladas en la Península Ibérica e Islas Baleares hasta el momento, cifras a las que sólo se acerca Cataluña.

Referencias

ALONSO-ZARAZAGA, M. A., 2002. Lista preliminar de los Coleóptera Curculionoidea del área ibero-balear, con descripción de *Melicius* gen. nov. y nuevas citas. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 31: 9-33.

- ALONSO-ZARAZAGA, M. A. & LYAL, C. H. C., 1999. *A World Catalogue of Families and Genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae)*. Entomopraxis. Barcelona. 315 pp.
- ALONSO-ZARAZAGA, M. A. & LYAL, C. H. C., 2002. Addenda and corrigenda to 'A World Catalogue of Families and Genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera)'. *Zootaxa*, 63: 1-37.
- ESCALERA, M. M. DE LA, 1919. Ipídos (Scolytidos) observados en la Península Ibérica, Marruecos y Canarias. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 19(2): 103-108.
- IGLESIAS IGLESIAS, L., 1922. Enumeración de los Curculiónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Boletín de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 18: 1-117.