

Notas Nomenclaturales

Designación del neotipo de *Ochodaeus montanus* Fuente (Coleoptera, Ochodaeidae) *

M.A. ALONSO ZARAZAGA
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, C.S.I.C.
José Gutierrez Abascal, 2, 28006 Madrid.

J.I. LÓPEZ-COLÓN
Plaza de Madrid 2, 28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

La especie *Ochodaeus montanus* Fuente, 1912 (familia *Ochodaeidae*), fue rehabilitada por López-Colón (1986), basándose en dos ejemplares provenientes de Molinicos (Albacete), conservados en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En dicho trabajo se indicaba que los tipos de esta especie -descrita con dos ejemplares de Fuencaliente, en la Sierra Morena de Ciudad Real- se habían perdido, ya que no existían en la colección Fuente, entonces conservada y expuesta en la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, aunque a pesar de ello no se designó neotipo.

Con motivo de la redacción del volumen que incluye la familia *Ochodaeidae* para el Proyecto Fauna Ibérica, se ha vuelto a investigar el paradero de los tipos, consultando a D. José Luis y D. Enrique Fernández Carrillo quienes se ocupan actualmente de la restauración y ordenación de la colección Fuente (depositada en el Museo Provincial de Ciudad Real), quienes amablemente nos han vuelto a confirmar su ausencia.

Como los tipos se pueden dar por perdidos y para evitar interpretaciones erróneas en el futuro, consideramos oportuno fijar el concepto de esta especie mediante la designación de un neotipo, que pertenece a la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Se trata de un ejemplar ♂ etiquetado: Molinicos, 29.V.1938 / NEOTYPUS / *Ochodaeus montanus* FUENTE,

1912. M.A. Alonso Zarazaga & J.I. López-Colón des. 97. Neotypus.

El ejemplar es precisamente aquél en que se basó la rehabilitación de la especie (López-Colón, 1986) y se detalló con minuciosidad en tal publicación. Mide 5,5 mm de longitud y sus características se ajustan a la descripción original. Presenta los siguientes caracteres diagnósticos: Cabeza apenas estrechada detrás de los ojos, con los lados subparalelos y el borde anterior del clipeo continuo, sin incisión o denticulación alguna en el centro, redondeado por delante. Cabeza y pronoto cubiertos de múltiples tuberculitos de pequeño tamaño, apretados, muy densos, formando un granulado menudo y regular. Tibias posteriores normalmente conformadas y el primer artejo del metatarso no engrosado. Fémures posteriores con un dientecito en la parte distal del margen posterior.

Referencias

LÓPEZ-COLÓN, J.I., 1986. Los *Scarabaeoidea* de la Península Ibérica. I. Familia *Ochodaeidae* (Coleoptera). *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 2: 29-38.

* Trabajo financiado por el Proyecto Fauna Ibérica IV (DGES PB95-0235)